

АУТИЗМ

ДИАГНОСТИКА

**АУТИЗМ -
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ
ДИАГНОЗ**

СКРИНИНГОВЫЕ ТЕСТЫ - предназначены для объективной самодиагностики и определения необходимости обращения к специалисту.

M-CHAT – Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста.

CARS – Диагностическая шкала раннего детского аутизма. Служит для начального скрининга признаков заболевания и степени тяжести.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

Тесты на аутизм для определения степени заболевания и общего нарушения уровня развития и навыков речевого общения.

Подходят для всех возрастных групп.


ADOS – Шкала наблюдения для диагностики аутизма. .

ADI-R – интервью для диагностики аутизма.

VB-MAPP

Тест VB-MAPP


(The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program)
разработан Марком Сандбергом
в 2008 г.
и с тех пор активно применяется
в практике



ABLLS-R

Инструмент оценки навыков ABLLS-R®

- ✓ Этот инструмент создан для того чтобы оценить уровень развития навыков
- ✓ Помочь родителям и специалистам установить, какие умения нужны ребенку для того, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающими и обучаться в повседневной жизни.



Первичная диагностика

- ❖ Анкетирование семьи - закрытая и открытая форма
- ❖ Знакомство – наблюдение
- ❖ Изучение документации других специалистов
- ❖ Оценка продуктивной деятельности
рисование и лепка
- ❖ Проведение одной и или нескольких диагностик

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:

- Установление контакта
- Начало и конец встречи – веселая, мотивирующая деятельность
- Привыкание ребенка к новому месту, новым людям





НАБЛЮДЕНИЕ

МОТИВАЦИЯ



ВАЖНО!

- ✓ Время на обработку информации
- ✓ Ограничить количество повторов инструкции
- ✓ Тестирование заканчивается на положительной эмоции
- ✓ Не забывать о перерывах.
- ✓ Убедитесь, что ребёнок понял задание





Контакты:

Наталья Алексеевна Кошелюк,
специальный психолог